

W iniekcji meloksykam ... pokonaj ból z firmą aniMedica!

Przeciw zakażeniom
Przeciw pasożytnictwu
Przeciw bólowi
Hormony
Kardiologiczne
Inne farmaceutyki
Pielęgnacyjne
Dodatki żywieniowe




Animeloxan® 20 mg/ml

aniMedica

skuteczne leczenie

Animeloxan, 20 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni



Animeloxan® 20 mg/ml

aniMedica

skuteczne leczenie

Animeloxan® 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

- ✓ sprawdzona substancja czynna – meloksykam
- ✓ skutecznie łagodzi ból i zwalcza zapalenie
- ✓ działa antyendotoksycznie
- ✓ skuteczny w pojedynczej iniekcji
- ✓ opakowanie 50 ml i 100 ml
- ✓ atrakcyjne ceny



Zastosowanie:



u bydła wykorzystywany w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego, przy biegunkach, w ostrych stanach zapalenia wymienia



u świń stosowany przy kulawiznach i zapaleniu w przebiegu schorzeń układu ruchu, w leczeniu wspomagającym posocznicy i toksemii poporodowej



u koni wykorzystywany przy ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno-mięśniowego, do ograniczenia bólu związanego z kolką

Dawkowanie:

2,5 ml/100 kg m.c.
s.c. lub i.v.

2,0 ml/100 kg m.c.
i.m.

3,0 ml/100 kg m.c.
i.v.

Okres karencji:

tkanki jadalne - 15 dni
mleko - 5 dni

tkanki jadalne - 8 dni

tkanki jadalne - 5 dni

Animeloxan® 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. Meloksykam.

Zawartość substancji czynnej (Innych substancji): 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: Substancja czynna: Meloksykam 20 mg. Substancje pomocnicze: Etanol bezwodny 158,00 mg. Przejrzysty, żółty roztwór do wstrzykiwań. **Wskazania lecznicze: Bydło:** Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego, w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych u bydła. Zmniejszenie objawów klinicznych biegunki w połączeniu z odpowiednią dawką terapią nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem laktacji. Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia w połączeniu z terapią antybiotykową. **Swinie:** Zmniejszenie objawów kulawizny i zapalenia w przebiegu niezakaźnych schorzeń układu ruchu. Leczenie wspomagające posocznicy i toksemii poporodowej (zespół mastitis-metritis-agalactia) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową. **Konie:** Ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu kostno-mięśniowego. Ograniczenie bólu związanego z kolką pochodzącą z układu pokarmowego. **Przeciwwskazania:** Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodni. Nie stosować u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi lub w przypadku występowania zmian wrzodowych w przewodzie pokarmowym. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W leczeniu biegunki u bydła nie stosować u zwierząt w wieku poniżej jednego tygodnia życia. **Działania niepożądane:** U bydła po pojedynczym podaniu podskórnym może wystąpić przejściowy, niewywołujący bólu obrzęk, który może utrzymywać się przez okres do 23 dni. Podanie dożylnie jest dobrze tolerowane. U świń dobrze są tolerowane dwa następujące po sobie podania domięśniowe z występującym po nich miejscowym podrażnieniem, które może utrzymywać się przez okres do 9 dni. U koni może wystąpić przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zanikający samodzielnie. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do reakcji anafylaktycznych, które należy leczyć objawowo. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulocie, poinformuj o nich lekarza weterynarii. **Docelowe gatunki zwierząt:** Bydło, świnia, koń. **Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania: Bydło:** Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylne w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg masy ciała (tj. 2,5 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe. **Swinie:** Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (tj. 2,0 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe. Jeśli zachodzi konieczność, meloksykam można podać powtórnie po upływie 24 godzin. **Konie:** Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała (tj. 3,0 ml/100 kg masy ciała). **Zalecenia dla prawidłowego podania:** Brak. **Okresy karencji:** Bydło: tkanki jadalne 15 dni, mleko 5 dni. **Swinie:** tkanki jadalne 8 dni. **Konie:** tkanki jadalne 5 dni. **Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:** Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 28 dni. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. **Specjalne ostrzeżenia:** **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:** W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego, unikać stosowania u zwierząt silnie odwodnionych, z hipotonią lub hipotensją, które wymagają pozajelitowego nawadniania. W przypadku niedostatecznego zmniejszenia reakcji bólowej podczas leczenia kolki pochodzącej z układu pokarmowego u koni, należy przeprowadzić ponowne rozpoznanie, ponieważ sytuacja taka może wskazywać na konieczność interwencji chirurgicznej. **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom:** Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować bolesność. Osoby o znanej nadwrażliwości na NLPZ powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. W przypadku samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. **Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności: Bydło i świnie:** Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji. **Konie:** Nie stosować u klaczy w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. **Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji:** Nie stosować równocześnie z glikokortykosteroidami, z innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi lub ze środkami przeciwciekropowymi. Przedawkowanie (w tym objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne. W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe. **Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niewyżytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie:** Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. **Inne informacje:** Butelki ze szkła bezbarwnego (typ I) o pojemności 50 ml i 100 ml zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i kapslem z aluminium/PP. Dostępne są pudełka tekturowe zawierające: 1 x 50 ml lub 12 x 50 ml, 1 x 100 ml lub 12 x 100 ml. Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. **Pozwolenie nr:** 2236/12. **Podmiot odpowiedzialny:** aniMedica GmbH, Im Suedfeld 9, 48308 Senden-Boesensel, Niemcy. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego: aniMedica Polska Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198 a, 81-571 Gdynia.